

**ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,
ЩО ВХОДЯТЬ В АПТЕЧКУ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ ТИПУ АМА-1**

1. ЗАСОБИ ДЛЯ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ, НАКЛАДЕННЯ ПОВ'ЯЗОК ПРИ ТРАВМАХ		
1.1	Джгут для зупинки кровотечі з маячком	1 од.
1.2	Бинт марлевий не стерильний 5 м x 5 см	1 од.
1.3	Вата медична не стерильна	1 од.
1.4	Лейкопластир бактерицидний 2 см x 7 см	2 од.
1.5	Презерватив	1 од.
2. АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ		
2.1	Серветка з фурагіном	1 од.
2.2	Серветка з хлоргексидином	1 од.
3. ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ТА СЕРЦЕВІ ЗАСОБИ		
3.1	Таблетки валідолу	1 од.
3.2	Новокаїн 0,5%	1 од.
4. ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ		
4.1	Шпильки англійські	
4.2	Палички ватні	
4.3	Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів	
4.4	Рукавички медичні	
4.5	Стаканчик для прийому ліків	
4.6	Шприц 2 мл для ін'єкцій	
4.7	Медичний маячок про допомогу	
4.0.1	Ручка для записів	
4.0.2	Інструкція по наданню само- та взаємодопомоги	1 од.
4.0.3	Футляр аптечки	1 од.
4.0.4	Охолоджуючий контейнер	

УВАГА!!! При закінченні терміну придатності або використанні склад аптечки необхідно обновити.

ПАСПОРТ

Найменування препарату по НТД: аптечка першої допомоги типу АМА-1

Комплектація по ТУ У23382040.110-98 і вимоги наказу МОЗ України № 187 від 07.07.1998 р. № 270 від 07.09.2000 р.

№ з/п	Найменування показників	вимоги нормативно-технічної документації	Результати випробувань
1	Маса укомплектованої аптечки	Не більше 1 кг.	Відповідає
2	Лікарські засоби, мед. вироби	Відповідає НТД і ФС	Відповідає
3	Комплектність	Відповідає переліку вкладень	Відповідає
4	Термін придатності		до 01.03.2022

Внісено в згідності з вимогами ТУ У23382040.110-98 і вимоги наказу МОЗ України № 187 від 07.07.1998 р. № 270 від 07.09.2000 р.

ПРАВИЛА НАДАННЯ САМО- І ВЗАЄМОДОПОМОГИ.

- 1. ТРАВМИ:** Удари, переломи, вивихи - біль, придухливість, кісткова крепітція, біль при осьовому навантаженні, укорочення кінцівки, виступ уламків в рану при відкритому переломі. Знеболення, іммобілізація (шинами, підручними засобами, або фіксація руки до тулуба, ноги до ноги). Холод на місце травми.
- 2. РАННІ КРОВОТЕЧІ:** а) Артеріальні (кров яскраво-червона, витікає пульсуючим струменем). Накласти джгут або мед. трубку з дозваною компресією вище за рану залишити записку з вказівкою часу накладення джгута, накласти на рану пов'язку. Кінцівку іммобілізувати, хворому дати знеболюючі. б) Венозні (кров темна, не пульсує), капілярні. Накласти на рану серветку, зробити пов'язку, що давить, бинтом. в) На рану накласти пов'язку, дати знеболююче, дрібні рани і садно обробити йодом або розчином діамантової зелені, а також перекиси, і заклеїти бактерицидним лейкопластиром.
- 3. ОПІКИ:** При опіках накласти пов'язку, дати знеболююче.
- 4. БОЛІ В СЕРЦІ:** Дати хворому одну пігулку валідолу, або 15 крапель корвалолу на 50 мл води.
- 5. НЕПРИТОМНІСТЬ:** Покласти хворого на підлогу, ноги підвести, дати понюхати нашатирний спирт (аміак) на затиші.
- 6. СЕРЦЕВО - ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ:** Проводиться за відсутності у хворого свідомості, пульсу та дихання на сонній артерії. Звільнити ротову порожнину і верхні дихальні шляхи від чужорідних предметів. Проводити штучне дихання і використовувати пристрій (плівка - клапан), і непрямий масаж серця (щоб уникнути обізначення дихання і пульсу (інструкція на плівці)).
- 7. ГАРЯЧИЙ І ЖАРОЗНИЖАЮЧІ ДІЇ:** При гарячкових станах, підвищені у хворого температури дати 1 пігулку аспіназилової кислоти і 1 пігулку ларакетамолу, при болях голови - атримон.
- 8. ГЛУХОТА:** дати виніти хворому 2-3 пігулки вугілля активованого, при проносі 2 пігулки магнієвої соди, при нечії розвести 10 гр. гідрокарбонату натрію (сода)

ПАНСЮРІ (підтримка) ПРИ РІЗНІЙ ПАТОЛОГІЇ:

1. Підтримання п'ятирічного (переломи хребта)
2. Положення «жаби» (переломи тазу)
3. Положення з підведеними ногами (непритомність, колапс, крововтратра)
4. Дренажне положення для запобігання запненню в дихальні шляхи блювотних мас, крові і ін. (несвідомий стан хворого)
5. «Шо напівсідять» положення (дихальна недостатність)

Правила складені на підставі наказу МОЗ України № 187 від 02.07.1998

Паспорт
Футляр аптечки медичної
ТУУ 64-0480922-051-99

Найменування основних показників	Вимоги НД	Фактичний результат
Вживані матеріали	Футляр має бути виготовлений з матеріалів, дозволених органами охорони здоров'я	Відповідає
Зовнішній вигляд	На корпусі і кришці футляра не допускаються: - тріщини і раковини; - сліди від штовхальників і вставок заввишки або глибиною 0,5 мм;	Відповідає
Міцність замку	Замок футляра повинен утримувати футляр в закритому положенні за наявності в ньому вантажу масою 1,5+-0,1 кг	Відповідає

Гарантійний термін зберігання 2 роки з дня виготовлення.

Висновок: Футляр аптечки медичної відповідає вимогам ТУ МУ 64-0480922-051-99